



## Purkinjellen (CDR 62)-Autoantikörper

<b>Akronym</b>	PCA-1 (Purkinje cell antibodies Typ 1)
<b>Synonyma</b>	anti- <u>Yo</u>
<b>Testparameter</b>	anti- <u>CDR62</u> (Serum) anti-CDR62 (Liquor) <u>Antikörper-Spezifität-Index</u>
<b>Material</b>	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL <u>Liquor</u> , 1 mL
<b><u>Referenzbereich</u></b>	<b>Serum:</b> 1 : < 1.000 Titer <b>Liquor:</b> 1 : < 100 Titer <b>ASI:</b> < 1,5
<b>Methode</b>	<u>EIDA</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u> , UK Neqas
<b>Siehe auch</b>	► <u>Autoantikörper-Tabelle - Neurologische Erkrankungen</u> (Laborinformation 2008)
<b><u>Anforderungsschein</u></b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Autoantikörper) <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Neurologische Erkrankungen)
<b>Auskünfte</b>	<u>Autoimmundiagnostik</u>
<b>Indikationen und Immunpathologie</b>	► siehe <a href="https://hpseelig.de">https://hpseelig.de</a>