



## Glutamat-Decarboxylase-Autoantikörper

<b>Akronym</b>	anti-GAD
<b>Testparameter</b>	anti-GAD (Serum) anti-GAD (Liquor)
<b>Material</b>	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL Liquor, 1 mL
<b><u>Referenzbereich</u></b>	<b>Serum:</b> < 10 IE/mL <b>Liquor:</b> < 10 IE/mL
<b>Methode</b>	<u>ELISA</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u> , <u>UK Neqas</u>
<b>Siehe auch</b>	► <u>Autoantikörper-Tabelle - Neurologische Erkrankungen</u> (Laborinformation 2008)
<b><u>Anforderungsschein</u></b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Autoantikörper, Rheumaserologie: Neurologische Erkrankungen, Paraneoplasien) <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Autoantikörper, Rheumaserologie: Neurologie (Liquor)) <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Autoantikörper, Rheumaserologie: Diabetes) <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Neurologische Erkrankungen: Liquor) <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Neurologische Erkrankungen: Serum)
<b>Auskünfte</b>	<u>Autoimmundiagnostik</u>
<b>Indikationen und Immunpathologie</b>	► siehe <a href="https://hpseelig.de">https://hpseelig.de</a>