



Lactoferrin

Material	Stuhl, 5g
<u>Referenzbereich</u>	< 7,2 µg/mL
Methode	Elisa
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>

Indikationen Erstdiagnose entzündlicher Darmerkrankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa). Beurteilung der Krankheitsaktivität entzündlicher Darmerkrankungen zur Verlaufskontrolle und der Abschätzung des Therapieverlaufs. Patienten mit HIV und /oder Hepatitis B und C, mit infektiöser Diarrhoe innerhalb der letzten 6 Monate sowie mit Kolostomie oder Ileostomie innerhalb des letzten Monats sollten nicht untersucht werden, da bei diesen Patientengruppen noch keine statistisch belastbaren Daten bezüglich klinischer Relevanz des Tests vorliegen.

Erhöhte Werte Aktive, chronische entzündliche Darmerkrankungen (Colitis ulcerosa, Morbus Crohn). Ebenfalls erhöht bei größeren Blutbeimengungen.

Erhöhte Werte können Hinweise auf ein bevorstehendes Rezidiv geben.