



T-Suppressor-Zellen

Material [EDTA-Blut, 2,7 mL \(Blutbildröhrchen\)](#), nicht kühlen!

Das Material sollte spätestens 24 Stunden nach Abnahme im Labor eintreffen. Für die Untersuchung werden vitale Lymphozyten benötigt.

Referenzbereich		Erwachsene > 17 Jahre	Jugendliche 6 - 16 Jahre	Kinder 2 - 5 Jahre	Kinder < 2 Jahre
Leukozyten	/ nL	4 - 9	5 - 13	4,5 - 15	5 - 20
	Lymphozyten	/ nL	1 - 3,6	1 - 5,3	1,7 - 5,9
NK-Zellen	%	20 - 45	20 - 50	20 - 70	40 - 70
	/ nL	0,05 - 1,05	0,07 - 1,2	0,1 - 1	0,1 - 1,4
B-Zellen	%	5 - 29	4 - 26	4 - 23	3 - 23
	/ nL	0,07 - 0,83	0,2 - 1,6	0,2 - 2,1	0,6 - 3,1
T-Zellen	%	7 - 23	8 - 31	14 - 44	4 - 41
	/ nL	0,6 - 3,1	0,7 - 4,2	0,9 - 4,5	1,4 - 8
Th-Zellen	%	61 - 85	52 - 78	43 - 76	39 - 85
	/ nL	0,3 - 2,2	0,3 - 2,1	0,5 - 2,4	0,9 - 5,5
Ts-Zellen	%	30 - 62	25 - 53	23 - 48	25 - 68
	/ nL	0,2 - 1,75	0,2 - 1,8	0,3 - 1,6	0,4 - 2,3
CD4/CD8 Ratio	%	21 - 49	9 - 35	14 - 33	9 - 32
		0,7 - 2,8	0,9 - 3,4	0,9 - 2,9	0,9 - 6,3

Methode [FC](#)

Qualitätskontrolle [Zertifikat](#)

Siehe auch [Lymphozyten-Differenzierung](#)

Anforderungsschein [Download](#) und [Analysenposition](#)

Auskünfte [Zelluläre Immunologie / Immungenetik](#)