

TRH-Test

Was Sie wissen müssen.
Was Sie beachten müssen.

Ihr behandelnder Arzt hat Ihnen einen TRH-Test empfohlen.

Ihr Termin zur Blutentnahme

Ist am um Uhr

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an das Praxisteam:

LIMBACH  GRUPPE

Limbach Gruppe SE
Im Breitspiel 15 | 69126 Heidelberg
www.limbachgruppe.com

Herausgeber: © Limbach Gruppe SE – 04/2018_V1



Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Ihr Arzt möchte einen TRH-Test bei Ihnen durchführen. Mit diesem Test lassen sich Funktionsstörungen im Hormonhaushalt der Schilddrüse feststellen.

Aus der Bestimmung der Hormonwerte im Rahmen dieses Tests kann Ihr Arzt wichtige Schlussfolgerungen für Ihre weitere Behandlung ziehen.

Bitte beachten Sie, dass bestimmte Medikamente vor dem Test abgesetzt werden müssen. Dazu gehört das L-Thyroxin. Dieses Medikament ist unbedingt mitzubringen, um es nach der Untersuchung einnehmen zu können. Bitte besprechen Sie dies mit Ihrem behandelnden Arzt.

Diese Anleitung erklärt Ihnen, was Sie vor und am Tage der Durchführung des Tests beachten müssen.

Wichtige Informationen für die Vorbereitung

Am Untersuchungstag

- Sie können am Untersuchungstag normal frühstücken und essen.
- Der Test kann zu jeder Tageszeit durchgeführt werden.
- Falls Sie L-Thyroxin einnehmen, bringen Sie die Medikamente unbedingt mit, um sie nach der Untersuchung einzunehmen (jedoch nicht vor der Testdurchführung).

Ablauf

- Vor Testbeginn empfiehlt sich ein Toilettengang.
- Es wird Ihnen ein Venenverweilkanüle gelegt und daraus Blut entnommen.
- Nach der ersten Blutentnahme bekommen Sie die Testsubstanz in die Vene gespritzt.
- Der Test dauert ca. 30 Minuten.

Nebenwirkungen

- Kurzzeitig können Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen auftreten. Ebenso können Blasendruck, Hitze- und Kribbelgefühl und ein heißer Kopf bemerkt werden.

Nach dem Test

- Sie können wie gewohnt nach Hause gehen. Ihre Fahrtauglichkeit ist nicht beeinträchtigt.